

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI – HGG  
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA – DIREP  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME/HGG

EDITAL Nº 02/2018

SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MASTOLOGIA

**RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS  
CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR**

**QUESTÃO Nº 10**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** DEFERIDO

**JUSTIFICATIVA:** Prezado candidato(a), em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que aumento de amilase pode acontecer em todas as situações descritas nas alternativas.

**QUESTÃO Nº 30**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** INDEFERIDO

**JUSTIFICATIVA:** Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que conforme informa o enunciado, a paciente já foi submetida a conização com margens livres que é o tratamento preconizado para estágio IA1, sendo indicado apenas seguimento citológico e colpocitológico. Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida.

**QUESTÃO Nº 33**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** INDEFERIDO

**JUSTIFICATIVA:** Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, conforme colocado pelo próprio candidato, no climatério, vão desaparecendo os compartimentos endócrinos mais especializados na síntese de estrogênio e progesterona. Ao mesmo tempo, os folículos se tornam menos sensíveis ao estímulo gonadotrófico. Com isso, fica funcionalmente ativo o estroma, que tem capacidade de sintetizar androgênios (androstenediona e testosterona), em resposta ao aumento de LH. Assim, apenas a assertiva IV é correta, dessa maneira, a alternativa (E) continua sendo válida. Referência: Ginecologia Endócrina, Rodrigues de Lima e Baracat, capítulo 25 Síndrome Climatérica.

**QUESTÃO Nº 39**

**RESULTADO DA ANÁLISE:** DEFERIDO

**JUSTIFICATIVA:** Prezado(a) candidato(a), em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que a constipação na gestação ocorre principalmente em função da progesterona e não das prostacilinas na hipotonia da musculatura intestinal, não havendo, portanto, alternativa correta.

Goiânia/GO, 08 de fevereiro de 2018.