

GABARITO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA APLICADA DIA 02/08/2026

1) D	31) B
2) A	32) A
3) B	33) D
4) D	34) C
5) C	35) C
6) A	36) C
7) C	37) D
8) A	38) A
9) B	39) A
10) C	40) A
11) A	41) A
12) C	42) C
13) A	43) B
14) C	44) B
15) C	45) D
16) C	46) A
17) D	47) C
18) D	48) B
19) A	49) B
20) D	50) C
21) A	51) C
22) B 2	52) A
23) B	53) D
24) B	54) B
25) D	55) A
26) A	56) C
27) A	57) D
28) D	58) C
29) C	59) D
30) C	60) ANULADA

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO, ALTERAÇÃO OU ANULAÇÃO DO GABARITO
PREMILINAR

PROVA OBJETIVA APLICADA DIA 02/08/2026

QUESTÃO 3: Mantido o gabarito da questão alternativa b. Justificativa: A recanalização da FTE é uma complicação pós-operatória que ocorre em consequência de um processo inflamatório decorrente de uma pequena deiscência esofágica que tende a erodir e, posteriormente, estabelecer comunicação com a sutura traqueal do colo da FTE. A traqueomalácia, item a (errado), causa estridor e desconforto respiratório, mas as crises graves acontecem tipicamente ao chorar ou tossir devido ao colapso dinâmico da traqueia, e não são desencadeadas de forma tão eletiva e imediata no momento exato da deglutição do líquido.

QUESTÃO 9: Alteração do gabarito de c para b. Justificativa: no manejo do trauma pélvico grave, a persistência ou recorrência de hipotensão severa (pressão arterial sistólica inferior a 80-90 mmHg), mesmo após ressuscitação volêmica adequada, é o principal indicador clínico de que há uma hemorragia arterial ativa na pelve que necessita de intervenção rápida. O item a está incorreto porque a existência de leão intra-abdominal confunde o diagnóstico, pois a hipotensão poderia vir do abdome. E a ausência de sangramento intra-abdominal no FAST/LPD que reforça a pelve como fonte principal. O item c está errado porque segundo o ATLS, não utiliza essa métrica temporal e de valor exato (superior a seis horas com déficit de valor 10) para definir especificamente a origem arterial pélvica.

QUESTÃO 36: Alteração do gabarito de d para c. Justificativa: a cefaleia repentina, especialmente em pacientes idosos, é um alerta para patologias vasculares graves e fatais, como a Hemorragia Subaracnoídea. O item d está errado porque cefaleia hípica acomete predominantemente idosos durante o sono, despertando o paciente, com duração de 15 a 4 horas, conforme critérios do ICHD-3.

QUESTÃO 49: Alteração do gabarito de a para b. Justificativa: O Risco Relativo é a razão entre a incidência da doença no grupo exposto (que comeu) e a incidência no grupo não exposto (que não comeu).

Incidência nos expostos (comeram o sorvete):

Adoeceram: 450

Total que comeu: 450 (adoeceram) + 550 (não adoeceram) = 1000

Incidência: $450/1000 = 0,45$

Incidência nos não expostos (não comeram o sorvete):

Adoeceram: 500

Total que não comeu: 500 (adoeceram) + 700 (não adoeceram) = 1200

Incidência: $500/1200 \cong 0,4167$

Cálculo do Risco Relativo (RR):

$$RR = 0,45 / 0,4167 = 1,08$$

QUESTÃO 55: Alteração do gabarito de b para a. Justificativa: A equipe de Saúde da Família (eSF) é a equipe prioritária da **Atenção Primária à Saúde** e é responsável por desenvolver ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integradas e da gestão qualificada. É dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes multiprofissionais assumem responsabilidade sanitária. A composição mínima para a implementação de uma equipe de Saúde da Família (eSF) deve prever:

- I. médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade;
- II. enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família;
- III. auxiliar ou técnico de enfermagem; e
- IV. agentes comunitários de saúde.

QUESTÃO 60: Anulação da questão. Justificativa: a banca examinadora considerou que na questão nº 60 há mais de um item correto.